

La Hemiplejía puede ser un trastorno presente en el nacimiento, o puede adquirirse después del nacimiento. La causa subyacente es el daño al cerebro como resultado del flujo sanguíneo alterado. La interrupción puede ser causada por varios factores.

La causa más frecuente de Hemiplejía es un accidente cerebrovascular.

Otra causa de la Hemiplejía puede ser la perturbación del flujo sanguíneo, a causa de una lesión en los centros motores del cerebro.

La Hemiplejía es similar a otra enfermedad llamada Hemiparesia, pero es mucho más grave. La Hemiparesia se caracteriza generalmente por un lado del cuerpo afectado por debilidad.



Un golpe, es la causa más frecuente de la Hemiplejía. El suministro insuficiente de sangre al cerebro conduce a una pérdida de las funciones cerebrales.

Un coágulo formado dentro del vaso sanguíneo que bloquea la sangre.

Un Trombo.

Una Hemorragia de un vaso sanguíneo que abastece al cerebro.

Una lesión en la cabeza.

Diabetes.

Un tumor cerebral.

La Meningitis.

El síndrome de la Migraña.

La Inflamación de los vasos sanguíneos.

Las enfermedades que afectan los nervios. Condiciones que se presentan desde el nacimiento.

Enfermedades hereditarias.



Familias Con Amor

Prolongación Hidalgo S/N.

Tel. 714 14 20330 / 140 8185

Facebook: @DIFTenancingo1921

Twitter: @diftenancingo19

Instagram: @diftenancingo1921



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



Ayuntamiento de Tenancingo



Hemiplejía



DIRECTORIO

Presidente:

Luis Fernando Gallegos Estrada

Directora:

Yezmin Acosta Martínez

Tesorero:


Eduardo E. Arizmendi Aguirre

Encargada del Programa

Erica Orihuela Flores



Familias Con Amor



¿Qué es la Hemiplejía?


La palabra “Plejía”, significa debilidad. Si es muy severa puede llegar a ser completa. “Hemi” implica a un lado del cuerpo.

Por lo tanto Hemiplejía significa la parálisis completa de la mitad del cuerpo, incluyendo brazo y la pierna.

Cualquier enfermedad o lesión en los centros motores del cerebro puede causar Hemiplejía.

Síntomas de la Hemiplejía

- Problemas para caminar.
- Problemas con el equilibrio al caminar.
- Dificultad para tragar.
- Problemas con la visión: Visión borrosa o debilitada.
- Problemas al deletrear.
- Adormecimiento, hormigueo o pérdida de las sensaciones en una mitad del cuerpo.
- Pérdida de control sobre el intestino y la vejiga.
- Problemas al tomar objetos, atar los cordones.
- Depresión.
- Mayor sensibilidad emocional.
- Pérdida de memoria.



Dependiendo del lado afectado habrá diferentes clases de Síntomas:

La Hemiplejía derecha esta causada por daños en el hemisferio izquierdo.

La Hemiplejía izquierda esta causada por daños en el hemisferio derecho.

La Hemiplejía derecha causa pérdida de sensaciones: esto es llamado afasia.

La Hemiplejía izquierda causa pérdida del control de los movimientos voluntarios.

Dificultad para tomar objetos.

Pérdida de capacidad de dibujar, peinarse o cocinar.

Las condiciones de la Hemiplejía alternante tiene episodios recurrentes. Pero, los ataques son precedidos por síntomas de advertencia como:

Bostezar

Fatiga

Sensación de estar muy cansado.